

## PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

**Názov vet. prípravku:** BOLFO obojok pre veľké psy

**Výrobca:** KVP, Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Spolková republika Nemecko.

**Držiteľ rozhodnutia:** BAYER s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika.

**Zloženie vet. prípravku:**

|                                   | Dĺžka | Hmotnosť | Propoxurum |
|-----------------------------------|-------|----------|------------|
| BOLFO obojok pre mačky a malé psy | 38 cm | 12,5 g   | 1,234 g    |
| BOLFO obojok pre veľké psy        | 70 cm | 45 g     | 4,442 g    |

**Indikačná skupina:** Veterinárny kozmetický prípravok.

**Popis vet. prípravku:** Hnedý plastový obojok.

**Druh a kategória zvierat:** Pre veľké psy je určený BOLFO obojok pre veľké psy (70 cm).

**Charakteristika:** Veterinárny prípravok obsahuje účinnú látku propoxur s účinkom na blchy, kliešte a ďalšie ektoparazity psov a mačiek.

**Oblasť použitia:** Prevencia proti blchám a kliešťom a iným ektoparazitom.

Je účinný proti blchám u mačiek 4 mesiace, u psov 5 mesiacov.

Je účinný proti kliešťom u mačiek a psov 10 týždňov.

**Spôsob použitia:** Účinok nastupuje 24 hodín po nasadení obojku.

Obojok má zviera nosiť nepretržite. Účinkuje stále, v pohybe aj v pokoji zvieratá. Zložte obojok pred šampónovaním, alebo keď pes pláva a opätovne ho nasadte po vyschnutí srsti.

Pred použitím vyberte obojok z ochranného vrecúška. Obojok rozviňte a odstráňte prípadné zvyšky plastových spojok. Nasadte obojok zvieratú na krk, príliš ho neuťahujte (medzi obojkom a krkom by mal zostať priestor na 2 prsty). Prevlečte koniec obojku cez pútku a odstrihnite presahujúcu časť na dĺžku 2 cm.

Pravidelne kontrolujte, či je obojok utiahnutý správne.

Zvieratá s neupravenou, matnou či mastnou srstou by sa mali pred nasadením obojku okúpať a vyšampónovať. Opakované namáčanie obojku (dážď, plávanie, kúpanie) môže ovplyvniť jeho účinok. Účinok a dĺžka účinku obojku závisí na dĺžke, hustote a stave srsti a na stupni zamorenia parazitmi. Pri poklese účinku môže byť potrebné vymeniť obojok ešte pred vypršaním deklarovanej dĺžky účinku.

Pri napadnutí blchami je často zamorené aj okolie zvieratá (pelechy, koberce, závesy, ...).

Z uvedeného dôvodu sa odporúča ošetriť vhodnými prípravkami proti blchám a pravidelne vysávať aj okolie zvieratá. Toto opatrenie znižuje zamorenie okolia a predlžuje ochranu pred novým napadnutím psov blchami.

**Upozornenie:** Kliešte spravidla uhynú a odpadnú z hostiteľa do 3 dní po napadnutí bez toho, aby sali krv. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť počas nosenia obojku k ojedinelému prichyteniu kliešte. Za takýchto nepriaznivých podmienok nie je možné jednoznačne zabrániť prenosu infekčných chorôb kliešťami.

Deti by sa mali vyvarovať bezprostrednému kontaktu so zvieratami, ktoré nosia obojok. Nedovoľte deťom hrať sa s obojkom. Obojok necmúľajte, nežujte, hlavne nie deti.

Počas nasadzovania obojku zvieratú nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii s obojkom si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou. Zabráňte kontaktu s kožou a očami. Tento veterinárny prípravok obsahuje karbamáty (propoxur). V prípade toxických symptómov vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Osoby so známou precitlivosťou na propoxur alebo na niektorú pomocnú látku by sa mali vyhnúť kontaktu s obojkom. Zvieratám, ktoré nosia obojok, by sa nemalo dovoliť spať v posteli spoločne so svojimi majiteľmi.

Vo veľmi vzácných prípadoch sa objavujú v mieste nasadenia reakcie ako je svrbenie, začervenanie kože, lézie a vypadávanie srsti. Vo veľmi vzácných prípadoch sa u niektorých zvierat po nasadení obojku môže vyskytnúť mierne svrbenie alebo začervenanie kože. Veľmi vzácne sa po požití obojku môžu objaviť príznaky ako zvracanie, hnačka alebo slinenie. Nepoužívajte v prípade precitlivosti na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku.

Nepripínať na krk pri poškodení kože, v rekonvalescencii a v chorobe. Nepoužívajte u zvierat s mechanickým upchatím tráviaceho alebo močového systému, bronchiálnou astmou a kardiovaskulárnymi chorobami, pretože karbamáty môžu vyvolať kontrakciu hladkých svalov.

Nepoužívajte u šteniat do veku 3 mesiacov.

Tento veterinárny prípravok sa vyznačuje zvýšenou toxicitou pre vodné organizmy, vtáky a včely. Obojok zložte pred kúpaním vo vodných tokoch, v ktorých sa vyskytujú vodné organizmy. Tento veterinárny prípravok by mohol dlhodobo narušiť vodné prostredie. Obaly nepoužívajte opakovane. Použité obojky musia byť zneškodnené na zvlášť vyhradených miestach.

**Veľkosť balenia:** 1 obojok s hmotnosťou 45 g a dĺžkou 70 cm.

**Čas použiteľnosti:** 60 mesiacov.

**Spôsob uchovávania:** Uchovávajúte pri teplote do 25°C.  
Uchovávajúte mimo dosahu a dohľadu detí.  
Skladujte oddelene od potravín a krmív.

**Označenie:** Len pre zvieratá.

**Bez predpisu veterinárneho lekára.**