

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA

FRONTLINE SPOT-ON pre mačky roztok na kvapkanie na kožu

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA VÝROBY ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK JE ROZDIELNY

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francúzsko

Výrobca pre uvoľnenie šarže

MERIAL, 4 chemin du Calquet, 31057 Toulouse Cedex, Francúzsko

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

FRONTLINE SPOT-ON pre mačky roztok na kvapkanie na kožu

Fipronilum

Vyhradený veterinárny liek

3. ZLOŽENIE LIEKU

1 pipeta (0,5 ml číreho, nažltlého roztoku) obsahuje:

Liečivo:

Fipronilum 50,00 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanizol (E 320) 0,10 mg

Butylhydroxytoluén (E 321) 0,05 mg

Roztok na kvapkanie na kožu - spot-on

4. INDIKÁCIA

Liečba a prevencia napadnutia blchami (*Ctenocephalides felis*) a kliešťami (*Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.) u mačiek.

Liečba a kontrola alergie na blšie uhryznutie (FAD) u mačiek.

Prevencia a liečba napadnutia všenkami (*Felicola subrostratus*) u mačiek.

5. KONTRAINDIKÁCIE

Vzhľadom k absencii údajov o použití lieku neaplikujte mačiatkam mladším 8 týždňov a / alebo vážiacim menej ako 1 kg.

Neaplikujte chorým zvieratám (celkové ochorenie, horúčka) alebo zvieratám v rekonvalescencii.

Nepoužívajte u králikov z dôvodu nebezpečenstva nežiaducich reakcií až úhynu.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Pokiaľ dôjde k olízaniu, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula.

V rámci veľmi zriedkavých nežiaducich účinkov boli po použití zaznamenané prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie (lupinatenie kože a vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože) a celkové

svrbenie alebo vypadávanie srsti. Výnimočne boli zaznamenané hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperesthesie, depresia, nervozita), zvracanie.

Vyvarujte sa predávkovania.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

7. CIEĽOVÝ DRUH

mačka

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA

Vzhľadom k absencii štúdií týkajúcich sa bezpečnosti lieku je minimálny interval medzi aplikáciami 4 týždne.

Cesta podania: vonkajšou podanie na kožu.

Dávkovanie: Aplikujte 1 pipetu s obsahom 0,5 ml na kožu medzi lopatkami.

Spôsob podávania:

Držte pipetu kolmo hore a odlomte hrot. Rozhrňte srst' zvierat'a medzi lopatkami tak, že je viditeľná koža. Priložte hrot pipety na kožu a niekoľkokrát stlačte tak, aby sa obsah vyprázdnil priamo na kožu, najlepšie na dvoch miestach.

Jedna dávka zabezpečí ochranu proti napadnutiu blchami po dobu až 5 týždňov.

Prípravok účinkuje 3 až 4 týždne proti kliešťom.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Zabráňte kontaktu prípravku s očami zvierat'a.

Je dôležité zabezpečiť aplikáciu prípravku na také miesto, z ktorého si ho zviera nemôže slíznout, a po aplikácii zabrániť vzájomnému olizovaniu zvierat.

Kúpanie mačiek počas dvoch dní po aplikácii lieku neodporúča.

Môže dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov. Preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb, ak sú podmienky nepriaznivé.

Blchy z domácich zvierat často napádajú zvieracie prepravky, miesta, kde zviera spí a odpočíva, ako sú koberce a domáce vybavenie, ktoré je potrebné v prípade masívneho napadnutia a na začiatku ochranných opatrení pravidelne ošetrovať vhodnými insekticídmi a čistiť pomocou vysávača.

10. OCHRANNÁ LEHOTA

Nie je určený pre potravinové zvierat'a.

11. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu detí.

Uchovávať pri teplote do 30 ° C.

Nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na obale.

12. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE

Tento liek môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí. Vyhnite sa preto kontaktu tohto lieku s ústami a očami.

Zvieratá alebo osoby, u ktorých je známa precitlivosť na insekticídy alebo alkohol, by nemali prísť do kontaktu s Frontline Spot On. Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu prstov s obsahom pipety. Pokiaľ k nemu dôjde, umyte si ruky vodou a mydlom.

V prípade náhodného zásahu oka opatrne vypláchnite oko čistou vodou.

Po použití si umyte ruky.

S ošetrovanými zvieratami a zamedzte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Preto sa neodporúča ošetrovanie zvieratá počas dňa, ale čoskoro zvečera, a nedovoliť čerstvo ošetrovaným zvieratám spať s ich majiteľmi, zvlášť deťmi.

Nefajčite, nepite ani nejedzte počas aplikácie lieku.

13. ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO, ak sa uplatňujú

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Fipronil môže mať nepriaznivý vplyv na vodné organizmy. Neznečisťujte prípravkom alebo prázdny obalom rybníky, vodné toky alebo nádrže.

14. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

máj 2010

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Len pre zvieratá.

Veľkosti balenia: 1 x1 pipeta, 3 x 1 pipeta.

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.