

## PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 2-5 kg  
Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 5-10 kg  
Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 10-20 kg  
Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 20-40 kg  
Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 40-60 kg

### 1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA POVOLENIA VÝROBY ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK JE ROZDIELNY

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francúzsko

Výrobca pre uvoľnenie šarže:

MERIAL

4, Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Francúzsko

### 2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 2-5 kg  
Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 5-10 kg  
Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 10-20 kg  
Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 20-40 kg  
Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy 40-60 kg

### 3. ZLOŽENIE LIEKU

Roztok na kvapkanie na kožu - spot-on.

Číry bezfarebný až žltohnedý roztok.

Liečivá / Pomocné látky:

Pozri časť "dávkovanie pre každý cieľový druh".

### 4. INDIKÁCIA

Na liečbu a prevenciu napadnutia blchami alebo kliešťami, kde je nevyhnutný repelentný účinok (brániaci cicaniu), proti kútovkám, bodavým muchám alebo komárom.

Blchy

Liečba a prevencia napadnutia blchami druhu *Ctenocephalides felis*, prevencia napadnutia blchami druhu *Ctenocephalides canis*. Jedno ošetrenie bráni ďalšiemu napadnutiu po dobu 4 týždňov. Liek môže byť použitý ako súčasť stratégie liečby alergie na blšie uhryznutie, ktorá bola vopred diagnostikovaná veterinárnym lekárom.

## Kliešte

Liečba a prevencia napadnutia kliešťami (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Jedno ošetrenie usmrčuje kliešte (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) a odpudzuje (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) počas 4 týždňov po ošetrení, a odpudzuje *Dermacentor reticulatus* od 7 dní do 4 týždňov po ošetrení.

## Komáre a kútočky

Odpudzuje (bráni cicaniu) kútočky (*Phlebotomus perniciosus*) počas 3 týždňov a komáre (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*) počas 4 týždňov.

Usmrčuje kútočky (*Phlebotomus perniciosus*) a komáre (*Aedes albopictus*) po dobu 3 týždňov.

## Bodavé muchy

Odpudzuje (bráni cicaniu) a usmrčuje bodavé muchy (*Stomoxys calcitrans*) po dobu 5-tich týždňov.

## 5. KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte v u chorých zvierat alebo zvierat v rekonvalescencii.

**Nepoužívajte u mačiek alebo králikov, pretože sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky a dokonca môže dôjsť k úhynu.**

Nepoužívať v prípade známej precitlivenosti na liečivá, alebo na niektorú z pomocných látok.

## 6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Po použití lieku sa pozorovali tieto veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: prechodné kožné reakcie v mieste podania (zmena farby kože, lokálna strata srsti, svrbenie, sčervenanie) a celkové svrbenie alebo strata srsti. Po použití bolo ďalej pozorované nadmerné slinenie, prechodné nervové príznaky (zvýšená dráždivosť, hyperaktivita, triaška, depresia, ďalšie nervové príznaky) alebo vracanie.

Pokiaľ dôjde k olízaniu miesta podania, môže byť pozorované prechodné nadmerné slinenie a vracanie.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

## 7. CIEĽOVÝ DRUH

Psy

## 8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA

Pre miestnu aplikáciu na kožu (podanie nakvapkaním na kožu - spot-on).

Liečebná schéma:

Použitie lieku by malo byť založené na potvrdenom napadnutí alebo riziku napadnutia blchami alebo kliešťami, kedy je tiež nevyhnutný repelentný účinok (brániaci cicaniu), proti kútočkám alebo komárom alebo bodavým muchám.

V závislosti od výskytu ektoparazitov môže byť indikované opakované ošetrenie. V takýchto prípadoch by interval medzi dvomi ošetreniami mal byť najmenej 4 týždne.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené veľkosti pipiet, ktoré majú byť použité v závislosti na veľkosti psa:

Frontline Tri-Act roztok na nakvapkanie na kožu - spot-on pre psy	Objem jednotlivej dávky (ml)	Liečivé látky		Pomocné látky
		Fipronilum (mg)	Permethrinum (mg)	Butylhydroxytoluen (E321) (mg)
Veľmi malé psy 2-5kg	0,5	33,8	252,4	0,563
Malé psy 5-10kg	1,0	67,6	504,8	1,125
Stredne veľké psy 10-20kg	2,0	135,2	1009,6	2,250
Veľké psy 20-40kg	4,0	270,4	2019,2	4,500
Veľmi veľké psy 40-60kg	6,0	405,6	3028,8	6,750
Psy > 60kg	Použite vhodnú kombináciu pipiet			

#### 9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Vyberte vhodnú veľkosť pipety podľa hmotnosti psa. Pre psov nad 60 kg použite vhodnú kombináciu dvoch veľkostí pipiet tak, aby čo najviac zodpovedali živej hmotnosti.

Liek by mal byť aplikovaný na dve nedostupné miesta, aby si pes nemohol miesto podania olízať. Tieto miesta sú na báze krku pred lopatkami a uprostred krku medzi lebečnej bázou a lopatkami.

Vyberte kartu s blistrami z obalu a oddel'te jeden blister. Vyberte pipetu odstrihnutím nožnicami pozdĺž bodkovanej čiary alebo otvorte odtrhnutím po odklopení označeného rohu. Držte pipetu vo zvislej polohe smerom od tváre a tela, pre otvorenie odstrihnete hrot pipety nožnicami. Rozhrňte srst' na chrbte psa, aby bola viditeľná koža. Priložte hrot pipety na kožu. Stlačte pipetu, aplikujte približne polovicu obsahu smerom nadol až do polovice krku medzi lebečnej bázou a lopatkami. Opakujte aplikáciu na báze krku pred lopatkami do vyprázdnenia pipety. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa uistite, že bol liek aplikovaný priamo na kožu, nie na srst'.

#### 10. OCHRANNÁ LEHOTA

Nie je určený pre potravinové zvieratá.

#### 11. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dosahu detí.

Uchovávať v pôvodnom blistri.

Uchovávať pri teplote do 25 ° C.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie uvedenom na škatuli po

"EXP". Čas použiteľnosti končí posledným dňom v uvedenom mesiaci.